



LS Dental

Ipoh · Dr. Kent Teoh

PANDUAN PESAKIT

Bila ubat membuat gusi **membesar**

Beberapa ubat biasa boleh menyebabkan gusi bengkak dan menutupi gigi. Ia boleh diuruskan — dan patut diketahui.

● **Ubat tekanan darah**


● **Ubat epilepsi**

● **Ubat pemindahan organ**


Bila gusi **membesar berlebihan**

Sesetengah ubat boleh menyebabkan tisu gusi **bengkak dan membiak**, jadi gusi perlahan-lahan menutupi gigi. Ia biasanya bermula di antara gigi dan, jika dibiarkan dengan plak, boleh membesar sehingga **menutupi gigi** dan menyukarkan pembersihan.

NORMAL



MEMBESAR



gusi menutupi gigi

Tiga kumpulan ubat

Kebanyakan kes datang dari satu daripada tiga kumpulan terkenal. Jika anda ambil salah satu dan perasan gusi berubah, ia patut disebut — **tetapi jangan sekali-kali berhenti ubat preskripsi sendiri.**

TEKANAN DARAH

Penyekat saluran kalsium

cth. **amlodipine**, **nifedipine** — untuk tekanan darah tinggi dan angina.

EPILEPSI

Phenytoin

ubat yang lama digunakan untuk **mengawal sawan.**

PEMINDAHAN ORGAN

Ciclosporin

ubat **penekan imun** selepas pemindahan organ.

Penting: ubat ini melakukan tugas penting. Perubahan gusi ialah kesan sampingan yang boleh diuruskan — jawapannya kerjasama antara doktor gigi dan doktor anda, bukan berhenti rawatan.


Rupanya & kenapa

Pembesaran itu biasanya **keras dan tak sakit** pada mulanya. Perkara terbesar yang memburukkannya ialah **plak** — jadi pembersihan ialah kawalan punca dan rawatan sekali gus.

● Apa yang mungkin anda perasan

- Gusi **bengkak di antara gigi** dahulu
- Gusi keras, berketul yang menutupi gigi
- Berdarah, dan makanan tersangkut yang sukar dibersihkan
- Susah mengunyah atau bercakap; senyuman berubah

Kitaran plak



Kawalan di tangan anda: memberus dan flos harian yang cemerlang mengekalkan plak rendah — yang mengekalkan pembesaran lebih kecil dan mudah diurus.

Cara ia **diuruskan**

Kebanyakan kes reda banyak dengan pembersihan baik dan kerjasama. Pembedahan hanya untuk yang degil — dan ia boleh kembali jika plak berulang.

● **Langkah-langkah**

- 1. Beritahu **doktor gigi dan doktor anda** — jangan berhenti ubat sendiri
- 2. Pembersihan profesional + pembersihan rumah cemerlang mengecilkan banyak
- 3. Doktor anda mungkin **tukar ke ubat lain** jika sesuai
- 4. Jika teruk, pembedahan gusi kecil (gingivektomi) membentuk semula

ⓘ **Ia boleh kembali:** jika kawalan plak menurun atau ubat diteruskan, jadi pemeriksaan dan pembersihan berkala mengawalinya.

Gusi bengkak sejak mula ubat baru?

Bawa senarai ubat anda — kami periksa gusi, bersihkan, dan bekerjasama dengan doktor anda untuk selebihnya.

 **wa.me/601111896237**